LUPIN : LISTE DES PRODUITS FONGICIDES AUTORISES EN BELGIQUE (2025)

(Mise à jour CePiCOP : Avril 2025)

Matières actives et concentration	Produits commerciaux	N°autorisation	Doses /ha				Firmes	Formulation	Nb applic. Max	Délai avant récolte	Zone tampon (acte autorisation)	t) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. **ZT min = 6 m**			2) Le long des fossés de bords de route, des fossés de drainage, etc. **ZT min = 1 m**		
												Technique de pulvérisation			**Technique de pulvérisation**		
			Anthracnose	Botrytis	Rouille	Sclérotinia						50 %	75 %	90 %	50 %	75 %	90 %
azoxystrobine 250 g/l	AMISTAR	8898P/B	1 l				SYNGENTA	SC	2 (b)	35 j.	5 m	6 m	6 m	6 m	2 m	2 m	1 m
	AZOXYSTROBIN 250 SC	32571P/P	1 l				PHYBELCO	SC	2 (b)	35 j.	5 m	6 m	6 m	6 m	2 m	2 m	1 m
	AZOXYSTROBIN 250 SC	1400P/P	1 l				PHYBELCO	SC	2 (b)	35 j.	5 m	6 m	6 m	6 m	2 m	2 m	1 m
	Fin : 30/06/26																
	CHAMANE 250 SC	11209P/B	1 l				ARYSTA	SC	2 (b)	14 j.	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	GLOBAZTAR AZT 250 SC	10793P/B	1 l				SYNGENTA	SC	2 (b)	35 j.	5 m	6 m	6 m	6 m	2 m	2 m	1 m
	LERAK (New)	32691P/B	1 l				SYNGENTA	SC	2 (b)	35 j.	5 m	6 m	6 m	6 m	2 m	2 m	1 m
	MIRADOR	10146P/B	1 l				ADAMA	SC	2 (b)	35 j.	5 m	6 m	6 m	6 m	2 m	2 m	1 m
	NIMAGIS (New)	32690P/B	1 l				SYNGENTA	SC	2 (b)	35 j.	5 m	6 m	6 m	6 m	2 m	2 m	1 m
	NORIOS	10907P/B	1 l				ARYSTA	SC	2 (b)	14 j.	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	ORTIVA	9326P/B	1 l				SYNGENTA	SC	2 (b)	14 j	5 m	6 m	6 m	6 m	2 m	2 m	1 m
	PROFI AZ 250 SC	11035P/B	1 l				ACTURA BE	SC	2 (b)	35 j.	5 m	6 m	6 m	6 m	2 m	2 m	1 m
	VERTAZA (New)	32689P/B	1 l				SYNGENTA	SC	2 (b)	35 j.	5 m	6 m	6 m	6 m	2 m	2 m	1 m
	ZAKEO 250 SC	10716P/B	1 l				SYNGENTA	SC	2 (b)	14 j.	5 m	6 m	6 m	6 m	2 m	2 m	1 m
	ZOXIS 250 SC	10684P/B	1 l				ARYSTA	SC	2 (b)	14 j.	10 m	6 m	6 m	6 m	5 m	2 m	1 m
boscalid 150 g/l + pyraclostrobine 250 g/l	PICTOR ACTIVE	11110P/B	1 l	1 l		1 l	BASF	SC	1		5 m	6 m	6 m	6 m	2 m	2 m	1 m
metconazole 60 g/l	CARAMBA	8883P/B			1,2 l		BASF	EC	1	28 j.	10 m	6 m	6 m	6 m	5 m	2 m	1 m
	PLEXEO 60	10724P/B			1,2 l		GLOBACHEM	SL	1	28 j	10 m	6 m	6 m	6 m	5 m	2 m	1 m
	REMOCCO 60	11255P/B			1,2 l		BASF	EC	1	28 j.	10 m	6 m	6 m	6 m	5 m	2 m	1 m
	SIRENA	10420P/B			1,2 l		PROTEX	SL	1	28 j.	10 m	6 m	6 m	6 m	5 m	2 m	1 m
	TURRET 60	10923P/B			1,2 l		GLOBACHEM	SL	1	28 j.	10 m	6 m	6 m	6 m	5 m	2 m	1 m
BIO-FONGICIDE – Autorisation en agriculture biologique – En post-semis, post-levée, dès la présence de sclérotes dans le sol :																	
10^9 CFU/g Coniothyrium minitans	LALSTOP CONTANS WG	9389P/B				2-4 kg	BAYER	WG	1	-	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
13% Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24	**TAEGRO** (New)	10965P/B		0,37 kg		0,37 kg	NOVOZYMES	WP	12 (a)	4 h	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m

(a) Intervalle minimum entre 2 applications : 3 jours.
(b) Intervalle entre 2 applications : 14-28 jours.

EC :	Concentré émulsionnable
SC :	Suspension concentrée
SL :	Concentré soluble
WG :	Granulés à disperser dans l'eau
WP :	Poudre mouillable

Pour toute mise à jour des autorisations de produits phytosanitaires en Belgique, consultez le site https://fytoweb.be
Le CePiCOP ne peut être tenu responsable des dommages à la culture ou à un manque d'action.

Avec le soutien financier du
SPW ARNE de la RW –
Recherche et Développement–
Centre Pilote CePiCOP