POIS PROTEAGINEUX : Liste complète des herbicides autorisés en Belgique

(Mise à jour : CePiCOP - Avril 2025) Source officielle : https://fytoweb.be

Herbicides autorisés en Belgique en pois protéagineux (pois récoltés secs (sans cosse) – pois fourragers (récoltés secs)) :

Matières actives et concentration	Noms des produits commerciaux	N°autorisation	Doses produit/ha	Firmes	Formulation	Nb d'applic. Max	Délai avant récolte (DAR)	Zone tampon (acte autorisation)	Remarques
PRE-LEVEE :									
aclonifène 600 g/l ***Pois fourragers récoltés secs :**	**CHALLENGE** **CHALLENGE Fin : 30/06/26** **ACLONIGOLD 600** **CHANON** **CRIMSON** **KENOFEN** **PROCLUS**	7936P/B 1275P/P 31620P/P 11023P/B 28341P/B 10983P/B 28398P/B	3-4 l/ha 3-4 l/ha 3-4 l/ha 3 l/ha 3-4 l/ha 3-4 l/ha 3-4 l/ha	BAYER CROPSC. PHYBELCO PHYBELCO GLOBACHEM SHARDA CERTIPLANT BAYER	SC SC SC SC SC SC SC	1/12 mois 1/12 mois 1/12 mois 1/12 mois 1/12 mois 1/12 mois 1/12 mois	- -	10m(75 %) 10m(75 %) 10m(50 %) 10m(75 %) 10m(90 %) 10m(75 %)	ZT : 10 m par rapport aux eaux de surface, avec technique réduisant la dérive de min. 75 % 4 l/ha contre repousses de colza et gaillet
aclonifène 500 g/kg + clomazone 30 g/kg	**NOVITRON DAMTEC** **TOUTATIS DAMTEC**	10338P/B 10561P/B	2,4 kg/ha 2,4 kg/ha	FMC Chemical FMC Chemical	WG WG	1 1	- -	20 m 20 m	
clomazone 360 g/l	**CENTIUM 360 CS** **CENTIUM 360 CS** (New) **GAMIT 360 CS** **LIBECCIO** **SIRTAKI** **SIRTAKI**	8925P/B 32961P/P 11005P/B 10732P/B 10918P/B 1389P/P	0,25 l/ha 0,25 l/ha 0,25 l/ha 0,25 l/ha 0,25 l/ha 0,25 l/ha	FMC Chemical EUROFYTO FMC Chemical SIPCAM SIPCAM PHYBELCO	CS CS CS CS CS CS	1 1 1 1 1 1	- - - - - -	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m	
clomazone 30 g/l + pendiméthaline 333 g/l	**STALLION SYNC TEC**	10274P/B	3 l/ha	FMC Chemical	CS	1	-	20 m	**Max. 2 kg pendiméthaline/ha/12 mois.**
clomazone 55 g/l + pendiméthaline 275 g/l	**BISMARK**	30265P/B	1,5-2 l/ha	SIPCAM	CS	1	-	20m(50%)	**Au plus tard 3 jours après le semis.**
pendiméthaline 455 g/l	**STOMP AQUA** **STOMP AQUA** **STOMP AQUA** **PROWL AQUA**	9839P/B 24949P/P 25298P/P 28123P/P	2,5 l/ha 2,5 l/ha 2,5 l/ha 2,5 l/ha	BASF EUROFYTO EUROFYTO EUROFYTO	CS CS CS CS	1 1 1 1	- - - -	20 m 20 m 20 m 20 m	**Max. 2 kg pendiméthaline/ha/12 mois.**

POST-LEVEE :									
bentazone 870 g/kg Restriction en 2025 : cfr. ci-dessous	**BASAGRAN SG*** **BASAGRAN SG*** **BASAGRAN SG* Fin : 30/06/25**	8771P/B 1195P/P 1398P/P	1,1 kg/ha 1,1 kg/ha 1,1 kg/ha	BASF SORALYS VSM Agrochem	SG SG SG	1 1 1	40 j. 40 j. 40 j.	5 m (75%) 5 m (75%) 5 m (75%)	Pois : 1-2 feuilles étalées (ou 2 vrilles formées) **Max. 960 g bentazone/ha/12 mois**
bentazone 480 g/l + imazamox 22,4 g/l Restriction en 2025 : cfr. ci-dessous	**CORUM***	10210P/B	1,25 l/ha ou 2 x 0,625 l/ha	BASF	SL	1 1-2	- -	5 m(75%) 5 m	Pois : 2-9 feuilles étalées (ou 2-9 vrilles formées) Intervalle de 7-21 jours entre 2 applications **Max. 960 g bentazone/ha/12 mois** **Max. 75 g imazamox /ha/12 mois** **Max. 1,25 l/ha/culture**
MCPB 400 g/l	**BUTIZYL**	5423P/B	5 l/ha	NUFARM	SL	1	-	1 m	Pois : 10 à 15 cm de haut
pyridate 450 g/kg	**LENTAGRAN 45 WP**	7911P/B	0,5-1 kg/ha	CERTIS BELCHIM	WP	1-2		2 m (75%)	Pois : 2 fe - 6 fe : 0,5 kg/ha Pois : 4 fe - 6 fe : 1 kg/ha
Anti-graminées :									
cléthodime 120 g/l ***Pois fourragers récoltés secs :**	**SELECT PRIM** **INTER SELECT Fin : 30/06/2025** **OCTAVION 120 EC Fin : 30/06/26** **SELECT PRO Fin : 30/06/2025** **SELECT PRO** **WOPRO PLUS Fin : 30/11/25**	9334P/B 1367P/P 1265P/P 1343P/P 29302P/P 1347P/P	1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 1 l/ha	ARYSTA ITICON PHYBELCO VSM Agrochem VSM Agrochem SIMONIS	EC EC EC EC EC EC	1 1 1 1 1 1	60 j. 60 j. 60 j. 60 j. 60 j. 60 j.	20 m 20 m 20 m 20 m 20 m 20 m	1 l/ha contre les graminées annuelles et repousses de céréales
cléthodime 240 g/l ***Pois fourragers récoltés secs :**	**CENTURION**	8246P/B	0,3-1,5 l/ha	ARYSTA	EC	1 1 1 2	60 j.	20m(75 %)	En mélange avec de l'huile de colza estérifiée. ZT : 20 m avec technique réduisant la dérive de 75 % 0,3-0,4 l/ha contre les graminées annuelles 0,5 l/ha contre repousses de céréales 0,75 l/ha sur chiendent x 2 applic. ou 1,5 l/ha contre chiendent

cycloxy**dime** 100 g/l	**FOCUS PLUS**	8905P/B	2-5 l/ha	BASF	EC	1	56 j.	1m(50 %)	Pois : 2-9 feuilles étalées (2-9 vrilles formées) ZT : 1 m avec technique réduisant la dérive de min. 50 % + mouillant 2 l/ha contre graminées annuelles 4-5 l/ha contre chiendent N'est pas compatible avec BASAGRAN SG
fluazi**fop**-P-butyl 125 g/l	**FUSILADE MAX** **FREQUENT** **PHANTOM**	9476P/B 10852P/B 11202P/B	1-3 l/ha 1-3 l/ha 1-1,5 l/ha	NUFARM SHARDA SHARDA	EC EC EC	2 1-2 2	90 j. 90 j. 90 j.	1 m 1m(50%) 1 m	Avant la floraison du pois. 1 l/ha contre vulpin, panic pied-de-coq 1,5 l/ha contre ray-grass, folle avoine, jouet du vent, repousses de céréales 3 l/ha ou 2 x 1,5 l/ha contre graminées vivaces, chiendent (15-20 cm max.) **Max. 375 g fluazifop-P-butyl/ha/12 mois**
quizalo**fop**-P-éthyle 50 g/l	**TARGA PRESTIGE** **TARGA MEGAMAX** **QUIZELCO**	8612P/B 10256P/B 26580P/P	1-3 l/ha 1-3 l/ha 1-3 l/ha	Nissan Chemical NUFARM PHYBELCO	EC EC EC	1-(2) 1-(2) 1-(2)	45 j. 45 j. 45 j.	1 m 1 m 1 m	En mélange avec une huile paraffinique renforcée d'un mouillant ionique ou non ionique. 1-1,5 l/ha contre vulpin des champs, panic pied-de-coq, jouet du vent (1 l : stade jeune ; 1,5 l : adventices plus développées) 1,25-1,5 l/ha contre folle avoine, repousses de céréales (1,25 l : stade jeune ; 1,5 l adventices plus développées) 3 l/ha ou 2x1,5 l/ha contre chiendent Les doses réduites ne peuvent pas être appliquées sur des sols lourds et /ou dans le cas où des résistances sont soupçonnées.

propaquiza**fop** 100 g/l ***Pois fourragers récoltés secs :**	**AGIL** **KALAMOS** **READY** (New) **ZETROLA**	8514P/B 30143P/B 33324P/B 10727P/B	0,75-1,5 l/ha 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5	ADAMA JT AGRO SHARDA ADAMA	EC EC EC EC	1-(2) 1-(2) 1-(2) 1-(2)	45 j. 45 j. 45 j. 45 j.	1 m 1 m 1 m 1 m	0,75-1 l/ha contre graminées annuelles (0,75 l : avant tallage ; 1 l : pendant tallage) 1-1,2 l/ha contre ray-grass, folle avoine (1 l : avant tallage ; 1,2 l pendant tallage) 1,5 l/ha contre chiendent ou 2 x 0,75 l/ha **Max. 1,5 l/ha/culture**
quizalo**fop**-P-tefuryl 40 g/l	**PANTERA**	10435P/B	2,25 l/ha	UPL	EC	1	60 j.	1 m (90%)	ZT= 1 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90 % 2,25 l/ha contre graminées annuelles et repousses de céréales

Remarque : Laisser un intervalle de 5 jours entre le traitement antidicotylées et le traitement antigraminées.

Restriction concernant l'utilisation de la bentazone en 2025 :

Afin de protéger les eaux, la Belgique a fortement réduit les autorisations dans différentes cultures pour l'utilisation de la bentazone, depuis 2024.
En 2025, l'usage du BASAGRAN et du CORUM est maintenu en pois protéagineux (pois récoltés secs, pois fourragers, petits pois, pois mange-tout), fèves et féveroles, haricots verts.

On ne peut pas semer le pois protéagineux à moins de 5 m des eaux de surface, c'est-à-dire le long des cours d'eau, le long des fossés, le long d'une étendue d'eau et le long d'une route équipée d'un système de collecte des eaux pluviales.

Nouveau en 2025 : Lors d'un traitement avec de la bentazone, une zone non cultivée (ou plutôt couverte avec un engrais vert) de **5 m** doit être respectée le long des **eaux de surface**.

L'utilisation de la bentazone est interdite en zone de protection de captage d'eau destinée à la consommation humaine de type IIa et IIb (voir sur WalOnMap) **ainsi qu'en sols vulnérables au lessivage** : <1% CO (carbone organique) ou nappe phréatique < 1 m ou roche karstique/nappe < 1 m par rapport à la surface du sol. Les zones de prévention sont consultables sur WalOnMap en sélectionnant les cartes « Captages-Série » et « Protection des captages ».

Avant l'achat et l'usage éventuel de la bentazone, il faut consulter la nouvelle carte indicative en 2025 sur le site de BASF (**www.agro.basf.be**) et vérifier la couleur de la parcelle où vous comptez utiliser cette matière active en 2025 (**couleur bleue : OK, parcelle admissible** ; **couleur rouge : parcelle où l'usage de la bentazone est interdit**).

Ensuite, **l'enregistrement de la parcelle est <u>obligatoire</u>** grâce à l'outil qui se trouve sur le site de BASF (www.basf.agro.be) ainsi que pour l'achat du produit. Un mail sera envoyé à la RW, à l'adresse suivante : pesticides@spw.wallonie.be, avec le plan de la parcelle, de préférence avec les coordonnées GPS, où la culture de pois protéagineux avec un traitement herbicide à base de bentazone est envisagée en 2025.

Lors de l'enregistrement de la parcelle, un document sera généré et sera présenté au fournisseur de l'herbicide.

Les jets qui seront utilisés pour la pulvérisation de la bentazone doivent permettre de réduire la dérive de minimum 75 %.

Ces conditions doivent être respectées pour espérer prolonger l'utilisation de la bentazone au-delà de 2025. Si ce n'est pas le cas, 2025 sera la dernière année d'utilisation.

Dans les zones d'exclusion pour la bentazone, les parcelles emblavées en pois, fèves, féverole et en haricots verts devront être désherbées selon les itinéraires mis en œuvre en agriculture biologique (fiche technique sur le désherbage mécanique du pois. Cfr. Biowallonie – CPL-Végémar.
https://www.protecteau.be/sites/default/files/2024-07/FT_DesherbageMecaniquePois.pdf

Les produits suivants ont été **<u>retirés en 2024</u>** : **BONALAN** (7186P/B), à base de benfluraline en pré-semis (Fin : 12/05/2024)
CENTIUM 360 CS (1166P/P, 1317P/P), **CLOMA 360** (1339P/P), à base de clomazone en pré-levée (Fin : 30/04/2024).

Légende :		
	CS = suspension de capsules	**SG** = granulés solubles dans l'eau
	EC = concentré émulsionnable	**SL** = concentré soluble
	SC = suspension concentrée	**WG** = granulés à disperser dans l'eau
		WP = poudre mouillable

Pour toute mise à jour des autorisations de produits phytosanitaires en Belgique, consultez le site https://fytoweb.be
Le CePiCOP ne peut être tenu responsable des dommages à la culture ou à un manque d'action.

Wallonie agriculture SPW

Avec le soutien financier du
SPW ARNE de la RW –
Recherche et Développement–
Centre Pilote CePiCOP

CePiCOP asbl

POIS PROTEAGINEUX Herbicides : Zones Tampons à respecter en Région wallonne, avec la technique de pulvérisation avec minimum 50 % de réduction de la dérive (obligatoire depuis le 01/01/2019)

(Mise à jour CePiCOP – Avril 2025)

				1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. **ZT min = 6 m**			2) Le long des fossés de bords de route, des fossés de drainage, etc. **ZT min = 1 m**		
				Technique de pulvérisation			**Technique de pulvérisation**		
Matière active et concentration	**Produits commerciaux**	**N° agréation**	Zone Tampon (acte d'autorisation)	50 %	75 %	90 %	50 %	75 %	90 %
aclonifène 600 g/l	**CHALLENGE**	7936P/B	10 m (75 %)	x	10 m	6 m	x	10 m	5 m
	CHALLENGE Fin : 30/06/26	1275P/P	10 m (75 %)	x	10 m	6 m	x	10 m	5 m
	ACLONIGOLD 600	31620P/P	10 m (75 %)	x	10 m	6 m	x	10 m	5 m
	CHANON	11023P/B	10 m (50 %)	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	CRIMSON	28341P/B	10 m (75 %)	x	10 m	6 m	x	10 m	5 m
	KENOFEN	10983P/B	10 m (90 %)	x	x	10 m	x	x	10 m
	PROCLUS	28398P/B	10 m (75 %)	x	10 m	6 m	x	10 m	5 m
aclonifène 500 g/kg + clomazone 30 g/kg	**NOVITRON DAMTEC**	10338P/B	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	TOUTATIS DAMTEC	10561P/B	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
clomazone 360 g/l	**CENTIUM 360 CS**	8925P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	CENTIUM 360 CS (New)	32961P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	GAMIT 360 CS	11005P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	LIBECCIO	10732P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	SIRTAKI	10918P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	SIRTAKI	1389P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
clomazone 30 g/l + pendiméthaline 333 g/l	**STALLION SYNC TEC**	10274P/B	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
clomazone 55 g/l + pendiméthaline 275 g/l	**BISMARK**	30265P/B	20 m (50%)	20 m	10 m	6 m	20 m	10 m	5 m
pendiméthaline 455 g/l	**STOMP AQUA**	9839P/B	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	STOMP AQUA	24949P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m

	STOMP AQUA	25298P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	PROWL AQUA	28123P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
bentazone 870 g/kg **Restriction en 2025**	**BASAGRAN SG***	8771P/B	5 m (75%)	x	6 m	6 m	x	**6** m	**6** m
	BASAGRAN SG*	1195P/P	5 m (75%)	x	6 m	6 m	x	**6** m	**6** m
	BASAGRAN SG*	1398P/P	5 m (75%)	x	6 m	6 m	x	**6** m	**6** m
bentazone 480 g/l + imazamox 22,4 g/l **Restriction en 2025**	**CORUM***	10210P/B	5 m (75%)	x	6 m	6 m	x	**6** m	**6** m
MCPB 400 g/l	**BUTIZYL**	5423P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
pyridate 450 g/kg	**LENTAGRAN 45 WP**	7911P/B	2 m (75%)	x	6 m	6 m	x	2 m	1 m
cléthodime 120 g/l	**SELECT PRIM**	9334P/B	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	INTER SELECT Fin : 30/06/25	1367P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	OCTAVION 120 EC Fin : 30/06/26	1265P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	SELECT PRO Fin : 30/06/25	1343P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	SELECT PRO	29302P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
	WOPRO PLUS Fin : 30/11/25	1347P/P	20 m	10 m	6 m	6 m	10 m	5 m	1 m
cléthodime 240 g/l	**CENTURION**	8246P/B	20 m (75 %)	30 m	20 m	10 m	30 m	20 m	10 m
cycloxydime 100 g/l	**FOCUS PLUS**	8905P/B	1 m (50 %)	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
fluazifop-P-butyl 125 g/l	**FUSILADE MAX**	9476P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	FREQUENT	10852P/B	1 m (50%)	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	PHANTOM	11202P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
quizalofop-P-éthyle 50 g/l	**TARGA PRESTIGE**	8612P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	TARGA MEGAMAX	10256P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	QUIZELCO	26580P/P	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
propaquizafop 100 g/l	**AGIL**	8514P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	KALAMOS	30143P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
	READY (New)	33324P/B	1 m	6 m	6 m	6m	1 m	1 m	1 m
	ZETROLA	10727P/B	1 m	6 m	6 m	6 m	1 m	1 m	1 m
quizalofop-P-tefuryl 40 g/l	**PANTERA**	10435P/B	1 m (90%)	x	x	6 m	x	x	1 m