POIS PROTEAGINEUX : LISTE DES PRODUITS INSECTICIDES AUTORISES EN BELGIQUE (2026)

Tenir compte des insectes pollinisateurs et auxiliaires, avant d'envisager un traitement insecticide.

❖ Le **puceron vert** est le ravageur du pois le plus fréquent et le plus nuisible pour le rendement : jusqu'à 30 quintaux/ha.

Pour observer les pucerons en pois protéagineux, il suffit d'écarter les feuilles près des boutons floraux ou de regarder à la face inférieure des « feuilles » (bractées) et sur les tiges. Les pucerons peuvent transmettre des **viroses** (c'était le cas en 2020, année de sécheresse et de forte pression pucerons) et sucer la sève de la plante ; ils affaiblissent les plantes et peuvent diminuer les rendements.

Insecticides autorisés en Belgique en pois protéagineux (Mise à jour : CePiCOP Mai 2026) :

Matières actives et concentration	Produits Commerciaux	N° autorisation	Sitone	Nb applic.	**Puceron**	Nb applic.	Thrips	Nb applic.	Tordeuse	Nb applic.	Firmes	Formulation	Nb d'applic. Max (a)	Délai avant récolte	Zone tampon (acte autorisation)
λ-cyhalothrine 100 g/l = PFAS - Cfs	AKAPULKO 100 CS	1237P/P	0.0625 l	1-2	0.075l	1-2	0.0625 l	1	0.0625 l	1-2	PHYBELCO	CS	2	7 j.	10 m
	KARATE ZEON	9231P/B	0,0625 l	1-2	0,075l	1-2	0,0625 l	1	0,0625 l	1-2	SYNGENTA	CS	2	7 j.	10 m
	KARATE ZEON	1067P/P	0,0625 l	1-2	0,075l	1-2	0,0625 l	1	0,0625 l	1-2	EUROFYTO	CS	2	7 j.	10 m
	KENDO	29009P/B	0,0625 l	1-2	0,075l	1-2	0,0625 l	1	0,0625 l	1-2	SYNGENTA	CS	2	7 j.	10 m
	KUSTI	29010P/B	0,0625 l	1-2	0,075l	1-2	0,0625l	1	0,0625 l	1-2	SYNGENTA	CS	2	7 j.	10 m
	NINJA	9571P/B	0,0625 l	1	0,075l	1-2	0,0625 l	1	0,0625 ll	1	SYNGENTA	CS	2	7 j.	10 m
λ-cyhalothrine 50 g/l = PFAS - Cfs	RAVANE 50	9647P/B	0,125 l	1	0,15 l	1	0,125 l	1	0,125 l	1	GLOBACHEM	EC	2	28 j	10 m
	LAMBDA 50 EC (Fin : 29/05/26)	9749P/B	0,125 l	1	0,15 l	1	0,125 l	1	0,125 l	1	SPARTA RES	EC	2	28 j.	10 m
	MARKATE 50 EC	10888P/B	0,125 l	1	0,15 l	1	0,125 l	1	0,125 l	1	GLOBACHEM.	EC	2	28 j.	10 m
γ-cyhalothrine 60 g/l = PFAS	NEXIDE (Fin : 30/09/2026)	10110P/B	0,063 l	1-2			0,063 l	1-2	0,063 l	1-2	PROTEX	CS	2	21 j.	20 m
cyperméthrine 500 g/l = Cfs	CYPELCO	1198P/P	0.05 l	1-2	0.05 l	1-2			0.05 l	1-2	PHYBELCO	EC	2	7 j.	20 m
	CYTHRIN MAX	10106P/B	0,05 l	1-2	0,05 l	1-2			0,05 l	1-2	PROTEX	EC	2	7 j.	20 m
	CYPERB	10357P/B	0.05 l	1-2	0.05 l	1-2			0.05 l	1-2	ARYSTA	EC	2	7 j.	20 m
	INSECTINE	1331P/P	0.05 l	1-2	0.05 l	1-2			0.05 l	1-2	SORALYS	EC	2	7 j.	20 m
deltaméthrine 25 g/l	DELTA-GLOB 25 EC	11237P/B	0,25 l	1	0,25 l	1-2	0,25 l	1-2			GLOBACHEM	EC	2	7 j.	5 m
	DELTAPHAR	10354P/B	0,25 l	1	0,25 l	1-2	0,25 l	1-2			ARYSTA	EC	2	7 j.	5 m
	DEMETRINA 25 EC	10943P/B	0,25 l	1	0,25 l	1-2	0,25 l	1-2			DIACHEM	EC	2	7 j.	5 m
	MEZENE	10367P/B	0,25 l	1	0,25 l	1-2	0,25 l	1-2			PROTEX	EC	2	7 j.	5 m
	POLUX	32052P/B	0,25 l	1	0,25 l	1-2	0,25 l	1-2			GALENKA	EC	2	7 j.	5 m
	SCATTO	30220P/B	0,25 l	1	0,25 l	1-2	0,25 l	1-2			GOWAN	EC	2	7 j.	5 m
	SPLENDOUR	10466P/B	0,25 l	1	0,25 l	1-2	0,25 l	1-2			ARYSTA	EC	2	7 j.	5 m
deltaméthrine 15 g/l	DECIS 15 EW	10646P/B	0,42 l	1-2	0,5 l	1-2	0,42 l	1-2			BAYER	EW	2	7 j.	5 m
	PATRIOT PROTECH	10717P/B	0,42 l	1-2	0,5 l	1-2	0,42 l	1-2			BAYER	EW	2	7 j.	5 m
	SPLIT	10718P/B	0,42 l	1-2	0,5 l	1-2	0,42 l	1-2			BAYER	EW	2	7 j.	5 m

flonicamide 500 g/kg = PFAS	AFINTO FLONICASTAR HINODE TEPPEKI TEPPEKI TEPPEKI ULTRA	11146P/B 28847P/P 10955P/B 9526P/B 29297P/P 27668P/B			0,14kg 0,14kg 0,14kg 0,14kg 0,14kg 0,14 kg	1 1 1 1 1 1					ISK BIOSC. PHYBELCO ISK EUROPE ISK EUROPE VSM AGRO. ISK BIOSC.	WG WG WG WG WG SG	1 1 1 1 1 1	- - - - - -	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
flupyradifurone 200 g/l	FLUPYSTAR 200 RIAMBA RIVALI PRIME SIVANTO PRIME VSM PRIME	36514P/P 11176P/B 38615P/P 10855P/B 1387P/P	 0,375 l 	 1 	0,375l 0,375l 0,375l 0,375l 0,375l	1 1 1 1 1					PHYBELCO BAYER EUROFYTO BAYER VSM AGRO.	SL SL SL SL SL	1 1 1 1 1	7 j. 7 j. 7 j. 7 j. 7 j.	20 m 20 m 20 m 20 m 20 m
pirimicarbe 500 g/kg = Cfs	PIRIMOR	6640P/B			0,4 kg	1-2					ADAMA	WG	2	7 j.	1 m
tau-fluvalinate 240 g/l (*) = PFAS	EVURE FLUVELCO 240 MAVRIK	10728P/B 30901P/P 7535P/B			0,2 l 0,2 l 0,2 l	1-2 1-2 1-2					ADAMA PHYBELCO ADAMA	EW EW EW	2 2 2	14 j. 14 j. 14 j.	10m(50%) 10m(50%) 10m(50%)
(*) aussi autorisé contre cécidomyies : 0,2 l/ha, 1-2 applications, avec un intervalle d'au moins 14 jours entre 2 applications ; et contre chenilles défoliatrices : 0,3 l/ha, 1-2 applications															
Insecticides autorisés en agriculture biologique :															
Pyrethrines 4,59 g/l + huile de colza 825,3 g/l	RAPTOL	9853P/B			6 l	1-2	6 l	1-2			NEUDORFF	EC	2	2 j.	20 m
Piperonyl butoxyde 255 g/l + pyrethrines 20 g/l	BIO-PYRETREX	9267P/B	5 l	1-2	5 l	1-2	5 l	1-2			EDIALUX	EW	2	2 j.	10 m
Beauvaria bassiana souche GHA 22 %	BOTANIGARD 22 WP	9907P/B					0,625 kg	1-25			MYCOTECH EUROPE	WP	25	1 j.	1 m
Bacillus thurigiensis :	Contre les chenilles défoliatrices :														
Subsp. Kurstaki souche ABTS 351 54%	DIPEL DF	10113P/B	0,5-1 kg							1-8	SUMITOMO	WG	8	-	1 m
Subsp. Aizawai souche ABTS-1857 15000 IU/mg	FLORBAC	10514P/B	0,75-1 kg/ha							1-7	SUMITOMO	WG	7	-	1 m
Subsp. Kurstaki souche EG2348 32000 IU/mg	LEPINOX PLUS	11127P/B	1 kg/ha							1-3	CBC (EUROPE)	WP	3	-	1 m
Subsp. Aizawai souche GC-91 50%	TUREX WG	10461P/B	1 kg/ha							1-3	MITSUI AGR.	WG	3	-	1 m
Subsp. Aizawai souche ABTS-1857 15000 IU/mg	XENTARI WG	9067P/B	0,75-1 kg/ha							1-7	SUMITOMO	WG	7	-	1 m
Maltodextrine 476 g/l	ERADICOAT MAX	10940P/B	20 l/ha contre les acariens tétranyques et mouches blanches/aleurodes (au moins 3 jours entre 2 applications)							1-5	CERTIS BELCHIM	SL	5		1 m (90%)

(a) Nombre d'applications maximales, indiqué dans l'acte d'autorisation des produits (cfr. https://fytoweb.be).

CS :	Suspension de capsules	**SL** :	Concentré soluble	**PFAS : Substances per- et polyfluoroalkyles**
EC :	Concentré émulsionnable	**SG** :	Granulés solubles dans l'eau	**Cfs : Molécules candidates à la substitution,**
EW :	Emulsion, huile dans eau	**WG** :	Granulés à disperser dans l'eau	reprises dans la liste de l'éco-régime
		WP :	Poudre mouillable	« Réduction d'intrants » (=ER RI)

Les produits à base de :

- λ-cyhalothrine KARIS 100 CS (10028P/B), KORADO 100 CS (10377P/B) (Fin : 27/10/25), SPARROW (11079P/B), SPARVIERO (10179P/B), SPARVIERO (1336P/P) (Fin : 03/08/25),

- flupyradifurone INTER AVANTA (1369P/P) (Fin : 30/06/25)
- pirimicarbe PIRIMOR (1337P/P), VSM PIRIMICARB (1368P/P) (Fin : 31/10/25)

ont été retirés en 2025. Ils ne sont donc plus autorisés et doivent être rangés avec les PPNU.

Zones Tampons à respecter en Région wallonne, avec la technique de pulvérisation avec minimum 75 % de réduction de la dérive (obligatoire depuis le 01/01/2026) – INSECTICIDES POIS :

				1) Le long des cours d'eau, plans d'eau, etc. **ZT min = 6 m**		2) Le long des fossés de bords de route, des fossés de drainage, etc. **ZT min = 1 m**	
				Technique de pulvérisation		**Technique de pulvérisation**	
Matières actives et concentration	**Produits commerciaux**	**N° autorisation**	Zone Tampon (acte d'autorisation)	75 %	90 %	75 %	90 %
λ-cyhalothrine 100 g/l = PFAS - Cfs	AKAPULKO 100 CS	1237P/P	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	KARATE ZEON	9231P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	KARATE ZEON	1067P/P	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	KENDO	29009P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	KUSTI	29010P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	NINJA	9571P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
λ-cyhalothrine 50 g/l = PFAS - Cfs	RAVANE 50	9647P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	LAMBDA 50 EC Fin : 29/05/26)	9749P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	MARKATE 50 EC	10888P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
γ-cyhalothrine 60 g/l = PFAS	NEXIDE (Fin : 30/09/26)	10110P/B	20 m	6 m	6 m	5 m	1 m
cyperméthrine 500 g/l = Cfs	CYPELCO	1189P/P	20 m	6 m	6 m	5 m	1 m
	CYTHRIN MAX	10106P/B	20 m	6 m	6 m	5 m	1 m
	CYPERB	10357P/B	20 m	6 m	6 m	5 m	1 m
	INSECTINE	1331P/P	20 m	6 m	6 m	5 m	1 m
deltaméthrine 25 g/l	DELTA-GLOB 25 EC	11237P/B	5 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	DELTAPHAR	10354P/B	5 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	DEMETRINA 25 EC	10943P/B	5 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	MEZENE	10367P/B	5 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	POLUX	32052P/B	5 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	SCATTO	30220P/B	5 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	SPLENDOUR	10466P/B	5 m	6 m	6 m	2 m	1 m
deltaméthrine 15 g/l	DECIS 15 EW	10646P/B	5 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	PATRIOT PROTECH	10717P/B	5 m	6 m	6 m	2 m	1 m
	SPLIT	10718P/B	5 m	6 m	6 m	2 m	1 m
flonicamide 500 g/kg = PFAS	AFINTO	11146P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	FLONICASTAR	28847P/P	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
	HINODE	10955P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m

	TEPPEKI TEPPEKI TEPPEKI ULTRA	9526P/B 29297P/P 27668P/B	1 m 1 m 1 m	6 m 6 m 6 m	6 m 6 m 6 m	1 m 1 m 1 m	1 m 1 m 1 m
flupyradifurone 200 g/l	FLUPYSTAR 200 RIAMBA RIVALI PRIME SIVANTO PRIME VSM PRIME	36514P/P 11176P/B 38615P/P 10855P/B 1387P/P	20 m 20 m 20 m 20 m 20 m	6 m 6 m 6 m 6 m 6 m	6 m 6 m 6 m 6 m 6 m	5 m 5 m 5 m 5 m 5 m	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
pirimicarbe 500 g/kg = Cfs	PIRIMOR	6640P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
tau-fluvalinate 240 g/l = PFAS	EVURE FLUVELCO 240 MAVRIK	10728P/B 30901P/P 7535P/B	10 m (50%) 10 m (50%) 10 m (50%)	6 m 6 m 6 m	6 m 6 m 6 m	5 m 5 m 5 m	1 m 1 m 1 m
Insecticides autorisés en agriculture biologique :							
Pyrethrines 4,59 g/l + huile de colza 825,3 g/l	RAPTOL	9853P/B	20 m	6 m	6 m	5 m	1 m
Piperonyl butoxyde 255 g/l + pyrethrines 20 g/l	BIO-PYRETREX	9267P/B	10 m	6 m	6 m	2 m	1 m
Bacillus thurigiensis	DIPEL DF FLORBAC LEPINOX PLUS TUREX WG XENTARI WG	10113P/B 10514P/B 11127P/B 10461P/B 9067P/B	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m	6 m 6 m 6 m 6 m 6 m	6 m 6 m 6 m 6 m 6 m	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m	1 m 1 m 1 m 1 m 1 m
Beauvaria bassiana	BOTANIGARD 22 WP	9907P/B	1 m	6 m	6 m	1 m	1 m
Maltodextrine 476 g/l	ERADICOAT MAX	10940P/B	1 m (90%)	-	6 m	-	1 m

Pour toute mise à jour des autorisations de produits phytosanitaires en Belgique, consultez le site https://fytoweb.be
Le CePiCOP ne peut être tenu responsable des dommages à la culture ou à un manque d'action.

Wallonie agriculture SPW

Avec le soutien financier de la DGARNE de la RW – Recherche et Développement– Centre Pilote CePiCOP

CePiCOP asbl